

屏東縣恆春國民中學學生covid-19疫苗注射須知

- 一、疫苗種類：BioNTech COVID-19疫苗。
- 二、疫苗成分：主要成分為SARS-CoV-2病毒棘蛋白(S protein)訊息RNA (messenger RNA, mRNA) (包覆在脂質奈米微粒中)，每劑 (0.3毫升) 含有30微克 COVID-19 mRNA。
- 三、適用年齡：12歲以上青少年及成人。
- 四、劑次間隔：接種劑次2劑。目前國內建議間隔至少28天，屆時視疫苗供應期程及情形，調整兩劑接種間隔為10-12週。
- 五、保護力：年滿16歲以上之青少年及成人受試者接種完成2劑接種7天後預防有症狀感染之有效性約94%，對於12至15歲青少年接種完成2劑接種7天後預防有症狀感染之有效性約100%¹。
- 六、接種禁忌：對於疫苗成分有嚴重過敏反應史，或先前接種本項疫苗劑次曾發生嚴重過敏反應者，不予接種。
- 七、可能副作用：疫苗接種後可能發生的反應大多為接種部位疼痛、紅腫，通常於數天內消失，其他可能反應包含疲倦、頭痛、肌肉痠痛、體溫升高、畏寒、關節痛及噁心，這些症狀隨年齡層增加而減少，通常輕微並於數天內消失。依據疫苗臨床試驗顯示接種第二劑之副作用發生比率高於第一劑。接種疫苗後可能發燒，通常約48小時可緩解。如有持續發燒 (可能另有感染或其他原因)、嚴重過敏反應如呼吸困難、氣喘、眩暈、心跳加速等不適症狀，應儘速就醫並告知醫師曾接種疫苗，以做為診斷之參考，。
- 若為疑似疫苗接種後嚴重不良事件，可經由醫療端或衛生局所協助通報至「疫苗不良事件通報系統」
(<https://www.cdc.gov.tw/Category/Page/3-aX1TBq4ggn5Hg2dveHBg>)。

八、注意事項：

- (一) 發燒或正患有急性中重度疾病者，宜待病情穩定後再接種。
- (二) 本疫苗不得與其他廠牌交替使用。若不慎接種了兩劑不同廠牌COVID-19疫苗時，不建議再接種任何一種產品。
- (三) 本疫苗不得與其他疫苗同時接種。依目前ACIP會議初步決議之委員意見，該疫苗與「流感疫苗」可間隔至少7天，與「其他疫苗(包含HPV疫苗)」之接種間隔尚須討論，爰仍維持14天，如小於上述間隔，則各該疫苗亦無需再補種。

- (四) 為即時處理接種後發生率極低的立即型嚴重過敏反應，接種後應於接種單位或附近稍作休息留觀15分鐘，離開後請自我密切觀察15分鐘，但針對先前曾因接種疫苗或任何注射治療後發生急性過敏反應之民眾，接種後仍請於接種處或附近留觀至少30分鐘。
- (五) 使用抗血小板或抗凝血藥物或凝血功能異常者施打後於注射部位加壓至少2分鐘，並觀察是否仍有出血或血腫情形。

九、接種作業：

- (一) COVID-19疫苗接種採自願性質，不強迫接種。請家長於充分了解疫苗接種效益及接種後可能發生之反應後簽署同意書，依其意願安排接種事宜。
- (二) 校園接種作業前，學校提供家長「COVID-19疫苗接種須知及評估暨意願書」，詳閱後簽署意願書提供學校辦理後續作業。國中、高中職/五專學生家長可於意願書選擇子女於校園集中接種或至衛生所/合約醫療院所。
- (三) 校園接種作業結束後由學校提供「COVID-19疫苗接種後注意事項及補接種通知單」，對於當日無法在校接種，或無學籍的青少年，可由學生及家長至「COVID-19公費疫苗預約平臺」進行意願登記及選擇醫療院所預約接種疫苗，並持意願書至該醫療院所接種疫苗。
- (四) 家長考慮期：9/9(四)~9/13(一)，
星期一回收接種通知單與接種意願書。未繳交家長，
再拜託老師們電話聯繫。